



¹ Lebensbedrohliche ABC Probleme:

A: Schwellung der Luftwege, Heiserkeit, Stridor

B: Tachypnoe, Giemen, Müdigkeit, Zyanose, SpO₂ < 92%, Verwirrtheit

C: Blässe, Schwitzen, Hypotonie, Schwäche, Schläfrigkeit, Bewusstlosigkeit

² **Adrenalin** (i.m. außer Sie haben Erfahrung mit i.v. Adrenalin)
(wiederholen Sie nach 5 Min, falls keine Besserung)

Erwachsene 500 µg i.m. (0,5 ml)

Kinder >12 J. 500 µg i.m. (0,5 ml)

Kinder 6–12 J. 300 µg i.m. (0,3 ml)

Kinder < 6 J. 150 µg i.m. (0,15 ml)

Adrenalin soll nur durch erfahrene Spezialisten i.v. gegeben werden
Titration mit Boli von 50 µg (Erwachsene), 1 µg/kg (Kinder)

³ I.v. Flüssigkeitsbolus (Kristalloide):

Erwachsene: 500 – 1000 ml

Kinder: 20 ml/kg

Stoppen Sie i.v. Kolloide
falls diese als Ursache in
Frage kommen.

⁴ **Chlorphenamine** Injektionslösung ist in deutschsprachigen Ländern nicht im Handel

Dimetinden/Clemastin

(langsam i.v.)

Erwachsene oder Kinder > 12 J. 0,1 mg/kg

Kinder ab 1 Jahr 0,03 mg/kg

⁵ **Hydrokortison**

(i.m. oder langsam i.v.)

Erwachsene oder Kinder > 12 J. 200 mg

Kinder 6-12 J. 100 mg

Kinder 6 Monate - 6 J. 50 mg

Kinder < 6 Monate 25 mg